

【腦膜炎雙球菌疫苗】

B型疫苗

製造藥廠	GSK 葛蘭素史克	Pfizer 輝瑞
國家	意大利 \$1,850/針	美國 \$1,850/針
適合注射人士	2個月大或以上	10歲或以上：2針 或 3針#
注射時間及劑量	2-23 個月：3針 2歲或以上：2針	# 感染風險較高人士或於B型腦膜炎雙球菌疾病爆發時，應接種3針以提升免疫效能
注射方式	肌肉注射	肌肉注射
血清型保護率	血清型 B：保護率 95-100%	血清型 B(覆蓋率95%)：保護率79.3 - 99.4%
註冊年份	2013年面世，2019年7月於香港註冊	2014年面世，2019年4月於香港註冊
權威認可	美國食品及藥物管理局(FDA)及 歐洲藥物管理局(EMA)	

ACWY 型四價疫苗

製造藥廠	Pfizer 輝瑞	Sanofi 賽諾菲 (一代)	Sanofi 賽諾菲 (二代)
國家	美國 \$1,280/針	法國 \$1,100/針	法國 \$1,280/針
疫苗類型	結合疫苗 (新式製造疫苗，較適合幼兒注射)		
適合注射人士	6 星期或以上	9個月大至55歲	1歲或以上
注射時間及劑量	6星期至5個月：3針 6個月至11個月：2針 1歲或以上：1針	9-23個月：2針 2-55 歲：1針	1歲或以上：1針
注射方式	肌肉注射	肌肉注射	肌肉注射
註冊年份	2012年面世， 2013年10月於香港註冊	2005年面世， 2012年9月於香港註冊	2020年面世， 2023年於香港註冊
權威認可	歐洲藥物管理局(EMA)	美國食品及藥物管理局(FDA)	美國食品及藥物管理局(FDA)及 歐洲藥物管理局(EMA)

*資料來源：腦膜炎雙球菌疫苗小冊子，詳情可向醫護人員查詢。

腦膜炎

ACWY & B 型
雙球菌疫苗(流腦)
Meningococcal Vaccine (ACWY & B)



認真專注 關懷
Precise, Focus and Care

www.kinetics.hk
www.kinetics-eshop.hk



E-SHOP

毅力綜合醫護體檢中心 Kinetics Integrated Medical & Health Centre

- 【佐敦 Jordan】** 九龍佐敦彌敦道363號恆成大廈14樓1409-12室 Tel: 3426 9771
Room 1409-1412, 14/F, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Jordan, Kowloon
- 【銅鑼灣 Causeway Bay】** 香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心(舊翼)17樓1709室 Tel: 3520 3292
Room 1709, 17/F, East Point Center (Old Wing), 555 Hennessy Road, Causeway Bay, H.K.
- 【荃灣 Tsuen Wan】** 新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號南豐中心19樓1912室 Tel: 3101 4866
Room 1912, 19/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, N.T.

服務時間 Service Hours: ● 星期一至五 Mon-Fri: 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 Sat: 09:00 - 14:00
● 星期日及公眾假期 Sun & Public Holiday: 休息 Closed

WhatsApp 查詢/預約: 9336 8186 (辦公時間內回覆，只接受文字訊息 Text Only)

一般查詢 General Enquiry: 2310 2997 / enquiry@kinetics.hk 客戶服務電郵 Customer Service E-mail: cs@kinetics.hk
網址 Website: www.kinetics.hk 網上商店 E-SHOP: www.kinetics-eshop.hk

條款及細則: 1.有效期至2025年12月31日。2.如有任何更改，恕不另行通知，以最新版本為準。3.網上或WhatsApp預約只接受一星期以後之預約，所有預約必須待本中心職員回覆作實方為有效。未經確定的預約將不獲受理，不便之處，敬請原諒。4.如有任何爭議，毅力醫護健康集團保留解釋和終止服務之最終決定權。版權所有，不得轉載。

kinetics.medical kinetics.medical

Copyright 2025 Apr

腦膜炎雙球菌 (流腦)

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起的疾病。早期病徵並不明顯，但病情惡化的速度十分快，當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症，更可於24小時內致命。

腦膜炎雙球菌感染

血清群	13種不同類型，疾病主要由其中6種血清群引起，包括：A、B、C、W、X、Y 型
傳播途徑	主要經由直接接觸患者口鼻分泌物而傳播
潛服期	由二至十日，一般為三至四日
病徵	- 腦膜炎雙球菌血症：包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現出血性紅疹(瘀斑)、休克、嚴重者更會致命 - 流行性腦膜炎：包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡；亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡
預防疫苗	現時沒有單一疫苗可預防所有常見的腦膜炎雙球菌感染只有預防 A、C、W、Y 型的結合疫苗及 B 型預防疫苗

! 腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡等。入侵性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼炎或肺炎等。

★ 初期症狀與感冒十分相似，較難識別 ★

● 可於 24 小時內致命

首 4-8 小時，早期症狀：
發燒、頭痛、食慾不振、嘔吐

12-15 小時，典型症狀：
敗血病：出血性紅疹
腦膜炎：頸部僵硬、畏光

15-24 小時，後期症狀：

敗血病：
· 神智不清 · 感染性休克
· 腦癇症 · 器官衰竭
· 失去知覺 · 死亡

腦膜炎：
· 中樞神經系統衰竭 · 失去知覺
· 神智不清 · 死亡
· 腦癇症

香港個案咁少，我哋需要打針嗎？

● 腦膜炎雙球菌感染可在任何年齡中發生，它難以診斷而且病程進展迅速，延遲治療可造成嚴重後果，例如腦部損害或死亡。

● 根據世界衛生組織（WHO）建議


雖然本港屬於腦膜炎雙球菌感染病發率較低的地區，但高危一族仍需接種腦膜炎雙球菌疫苗：

- 到高危地區旅遊之人士（中國各地為病發率較高的地區）
- 患有免疫系統疾病之人士
- 兒童及青年居住於人口稠密的地方
- 準備到其他國家留學之青少年

● 中國疾病預防控制中心已於2008年將此病疫苗加入國家免疫計劃內（即所有中國出生的嬰兒均會接種）。C型腦膜炎雙球菌感染的比例開始下降，但B型腦膜炎雙球菌感染則持續上升。

2018 年香港個案血清分佈

自A.C.W.Y.型腦膜炎雙球菌結合疫苗於2005年市場推出後，全球社區保護率提高，A.C.W.Y.型感染個案因此減少。唯B型感染則於世界各地相應增加（2018年，香港有半數個案為B型感染），所以建議幼童亦應考慮接種。



疫苗小知識

- 於中國大陸，腦膜炎雙球菌感染普遍稱為“流腦”，疫苗多為內地製造的多醣體疫苗，效用會稍遜於外國的結合疫苗。
- ACWY型4價結合疫苗及B型疫苗均可與多種兒童及旅遊疫苗同時接種。
- 如曾接種多醣疫苗，可以補ACWY型4價結合疫苗作加強劑。
- 中國疾病預防控制中心已於2008年將此病疫苗加入國家免疫計劃內（即所有中國出生的嬰兒均會接種）。C型腦膜炎雙球菌感染的比例開始下降，但B型腦膜炎雙球菌感染則持續上升。