

1. 我已經接種人類乳頭瘤病毒 (HPV) 疫苗，我是否需要接受子宮頸篩查？

需要。即使你已接種人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗，仍須定期接受子宮頸篩查，因為HPV疫苗並不能預防所有類型的 HPV 感染，亦不能清除已受感染的病毒。

2. 在兩次子宮頸篩查之間，會出現子宮頸癌嗎？

大部分子宮頸癌是由於持續感染其中一種致癌或高風險類型的人類乳頭瘤病毒(又稱HPV)所致。部分子宮頸癌前細胞病變可能會在數年間發展成為癌症。

子宮頸癌有可能在兩次子宮頸篩查之間出現，而這種情況主要是發生在那些沒有定期接受子宮頸篩查的女性身上。另外，有些個案則是因為最近一次檢驗未能發現到不正常細胞所致(假陰性結果)。因此，定期接受子宮頸篩查是非常重要的。所有篩查方法都有其限制，也不是百分之百準確。因此，即使最近一次子宮頸篩查結果正常，你仍應該定期接受子宮頸篩查及留意子宮頸癌的症狀，如果出現任何症狀，應盡快求診。

3. 我已經到達更年期了，我是否需要接受子宮頸篩查？

需要。更年期不會減低女性患上子宮頸癌的機會。只要你過去曾經有性行為，即使你已經到達更年期，亦應該定期接受子宮頸篩查。

4. 我已很久沒有性行為，我是否需要接受子宮頸篩查？

需要。子宮頸癌可以發生在已經在很久前開始性行為的女性。事實上，子宮頸癌的風險是隨著年齡而增加。因此，即使你只有一次或已很久沒有性行為，你都需要定期接受子宮頸篩查。

如果你從未接受過子宮頸篩查，你應該盡快接受篩查。

5. 我曾做手術切除子宮及子宮頸，我是否需要接受子宮頸篩查？

一般來說，婦女如已因良性疾病切除子宮及子宮頸，同時沒有子宮頸細胞病變的病歷，則可停止子宮頸篩查。如有疑問，請諮詢你的醫生。

6. 如果我已經懷孕，可以進行子宮頸篩查？

婦女接受子宮頸篩查後有機會出現陰道出血，故此懷孕期間未必是最理想的檢驗時間。不過，醫護人員會視乎你的臨床情況及篩查紀錄，建議你應在何時進行子宮頸篩查。如有疑問，請諮詢你的醫生。

子宮頸檢查 Cervical Screening

	原價	附加價
• 超薄柏氏抹片檢查 Thinprep #	\$450	\$320
• 人類乳頭瘤病毒基因檢測 (33種) HPV DNA Test # (33 Types)	\$800	\$700
• 超薄柏氏抹片檢查 + 人類乳頭瘤病毒基因檢測 (33種) Thinprep + HPV DNA Test (33 Types) #	\$1,000	\$900
• 人類乳頭瘤病毒基因檢測 (27種) HPV DNA Test (27 Types) # (尿液檢查 Urine Test)	\$1,280	\$1,180

注意事項：1. 女士應避免在月經期間留樣本，以免因雜質過多影響結果
2. 適合男士參加 3. 使用人士必須年滿 18 歲

身體檢查小貼士

只適合曾有性行為之女士參加 (由女註冊護士進行 Sampling By Female Registered Nurse)
(附加價只適用於參加健康檢查計劃之客戶，並須於完成檢查三個月內注射)

1. 經期後一至兩星期進行超薄柏氏抹片檢查，能提供較準備之檢查結果。
2. 進行檢查前一天，避免進行任何陰道灌洗及性行為。
3. 如懷疑懷孕或於懷孕期間，不可進行超薄柏氏抹片檢查。

所有檢查項目 / 樣本必須於檢查日起一個月內完成 / 提供，逾期作廢及不獲退款。

毅力綜合醫護體檢中心 (辦公時間內回覆，只接受文字訊息Text Only)

<p>【佐敦 Jordan】 九龍佐敦彌敦道363號 恆成大廈14樓1409-12室 Room 1409-1412, 14/F, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Jordan, Kowloon WhatsApp: 9555 3733 Tel: 3426 9771</p>	<p>【銅鑼灣 Causeway Bay】 香港銅鑼灣軒尼詩道555號 東角中心(善翼)17樓1709室 Room 1709, 17/F, East Point Center (Old Wing), 555 Hennessy Road, Causeway Bay, H.K. WhatsApp: 9555 9132 Tel: 3520 3292</p>	<p>【荃灣 Tsuen Wan】 新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號 南豐中心19樓1912室 Room 1912, 19/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, N.T. WhatsApp: 6129 9126 Tel: 3101 4866</p>	<p>【沙田 Sha Tin】 新界沙田沙田車站圍1號 連城廣場7樓708室 Shop 708, 7/F, Citylink Plaza, 1 Shatin Station Circuit, Shatin, N.T. WhatsApp: 9889 1599 Tel: 3704 7168</p>
---	--	---	---

服務時間 Service Hours: ● 星期一至五 Mon-Fri: 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 Sat: 09:00 - 14:00
● 星期日及公眾假期 Sun & Public Holiday: 休息 Closed

客戶服務 Customer Service: **WhatsApp 9336 8186** (只接受文字訊息) / **cs@kinetics.hk** 網址 Website: **www.kinetics.hk**
一般查詢 General Enquiry: **2310 2997 / enquiry@kinetics.hk** 網上商店 E-SHOP: **www.kinetics-eshop.hk**



條款及細則: 1. 有效期至2024年12月31日。2. 如有任何更改，恕不另行通知，以最新版本為準。3. 網上或WhatsApp預約只接受一星期以後之預約，所有預約必須待中心職員回覆作實方為有效。未經確定的預約將不獲受理，不便之處，敬請原諒。4. 如有任何爭議，毅力醫護健康集團保留解釋和終止服務之最終決定權。版權所有，不得轉載。



Copyright 2024 Apr

子宮頸癌

篩檢 Cervical Cancer Screening



認真 專注 關懷
Precise, Focus and Care


www.kinetics.hk
www.kinetics-eshop.hk



「子宮頸癌」

子宮頸癌是香港婦女常見的癌症之一，是一種影響子宮頸的惡性腫瘤。子宮頸癌不是通過遺傳而感染，大部分子宮頸癌是由於持續感染其中一種致癌（或高風險類型）的人類乳頭瘤病毒（HPV）所致。HPV可引致子宮頸的癌前病變及癌症。定期接受子宮頸篩查，及早發現和治療早期的子宮頸細胞癌前病變，能預防子宮頸癌。

子宮頸癌並不是通過遺傳而感染，感染人類乳頭瘤病毒(HPV)是導致子宮頸癌的主要原因。一般而言，受HPV感染後，子宮頸上皮鱗狀細胞會發生變化，分為子宮頸上皮內瘤一級(CIN1)，二級(CIN2)和三級(CIN3)，最後成為子宮頸癌。



患上子宮頸癌之風險因素

大部分子宮頸癌是由於持續感染其中一種致癌(或高風險類型)的人類乳頭瘤病毒(又稱 HPV)所致。

引致 HPV 感染或子宮頸癌的風險因素，包括：

- 有多個性伴侶
- 免疫能力減弱
- 過早開始有性行為
- 多次生育或第一次懷孕時年齡較輕
- 同時感染性病
- 長期服食避孕丸超過五年(但停止服藥十年以上風險會回復正常)
- 吸煙

預防子宮頸癌

科學證據已證實定期接受子宮頸篩查是有效預防子宮頸癌的方法。

除定期篩查外，你亦可以採取以下預防措施，以減少感染人類乳頭瘤病毒(HPV)及患子宮頸癌的風險：

- 接種 HPV 疫苗(最理想於未曾有性行為時接種 HPV 疫苗)
- 採取安全性行為(例如使用安全套及避免有多個性伴侶等)，以減低感染 HPV 及其他性病的機會
- 避免吸煙

男女一生中感染 HPV 病毒的機會高達八成

女性：及早檢測減低子宮頸癌風險
男性：有機會將致癌 HPV 病毒傳染給伴侶

及早檢測，保障自己及伴侶健康！

常見的子宮頸篩查方法

1：人類乳頭瘤病毒(HPV)檢測 (HPV DNA 檢測)


高風險類型的 HPV 可引致子宮頸細胞出現不正常的病變。HPV DNA 檢測是檢測子宮頸細胞有否受高風險類型的 HPV 感染的檢測。對 HPV DNA 檢測呈陽性反應的婦女必須接受進一步的檢測，若檢測結果顯示不正常，應諮詢醫生，了解作進一步檢查的需要和跟進的建議。

傳統的 HPV DNA 採樣方法跟子宮頸抹片檢查相似，醫護人員會進行子宮頸拭子採樣，進行核酸檢測。

現時 HPV DNA 尿液樣本測試，能檢測 27 種 HPV DNA，包括 14 種高風險致癌 HPV 和 13 種低風險 HPV。由於是尿液檢查，病人可在家人自行取液採樣。

	HPV DNA 尿液檢測	傳統 HPV DNA 子宮頸檢測	柏氏抹片檢查
檢測目標	檢測 HPV DNA 及早評估患上子宮頸癌風險	檢測 HPV DNA 及早評估患上子宮頸癌風險	檢查子宮頸細胞是否出現異變(如：癌前病變和子宮頸癌)
檢測技術	採用 PHASiFY 專利技術及牛津納米孔 DNA 定序技術	採用核酸檢測	化驗師透過顯微鏡檢視子宮頸細胞樣本是否出現異樣
採樣方式	自行尿液採樣(可在家或診所進行)	子宮頸拭子採樣(在診所進行)	子宮頸拭子採樣(在診所進行)
適合人士	適合曾有性行為之女士及所有男士	適合曾有性行為之女士	適合曾有性行為之女士

2：子宮頸細胞檢驗(又稱：子宮頸抹片或柏氏抹片)



子宮頸細胞檢驗是檢測子宮頸細胞有否不正常病變的測試，建議定期進行檢以預防子宮頸癌。進行子宮頸篩查的時候，醫生或護士會將擴張器(俗稱鴨咀鉗)放進女性的陰道內，然後用刷子於子宮頸的表面位置抽取樣本，再送到化驗室檢驗是否有細胞異變。

不正常的細胞並不一定代表癌症，而子宮頸細胞出現變化時，可能並無任何症狀、不適或疼痛，因為必須在發展成癌症之前儘早進行適當的治療。若子宮頸細胞檢驗結果顯示細胞有病變，醫生一般會作進一步檢查(例如陰道鏡檢查)和治療。

子宮頸篩查 (適合曾有性行為之女士)

21 至 24 歲	按照醫生的評估和建議接受篩檢
25 至 29 歲	連續 2 年的子宮細胞檢驗結果正常，以後可每 3 年接受一次篩查
30 至 64 歲	應接受以下任何一種篩檢方法： 1. 若連續 2 年的子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每 3 年接受一次篩查 2. 每 5 年接受一次 HPV DNA 檢測 3. 每 5 年接受一次 HPV DNA 檢測與子宮頸細胞檢驗的合併檢測
65 歲或以上	1. 如在過去 10 年的常規篩查均得出正常結果，可停止接受篩查 2. 如從未接受子宮頸篩查，應該接受篩查