

性病檢查計劃

原價

VD01 \$980 VD02 \$1,380 VD03 \$2,480 VD04 \$3,500

1.	乙型肝炎表面抗原 (定量) Hepatitis B surface Antigen (Quantitative)	\$250	●	●	●	●
2.	愛滋病 1&2 病毒抗體 及 p24 抗原 HIV1&2 Antibody & p24 Antigen	\$400	●	●	●	●
3.	皰疹病毒 2 型抗體 Herpes Simplex Virus II Antibody	\$380	●	●	●	●
4.	梅毒血清試驗 Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)	\$80	●	●	●	●
5.	梅毒螺旋菌抗體 Treponema Pallidum Antibody	\$250		●	●	●
6.	衣原體抗體 Chlamydia Antibody	\$350		●	●	●
7.	衣原體基因測試 Chlamydia DNA (CT)	\$700			●	●
8.	淋病菌基因測試 Gonorrhea DNA (NG)	\$700			●	●
9.	解脲脲原體基因測試 Ureaplasma Urealyticum DNA (UU) 微小脲原體基因測試 Ureaplasma Parvum DNA (UP) 生殖支原體基因測試 Mycoplasma Genitalium DNA (MG) 人型支原體基因測試 Mycoplasma Hominis DNA (MH) 滴蟲基因測試 Trichomonas Vaginalis DNA (TV) 皰疹病毒 1 & 2 型基因測試 Herpes Simplex Virus 1 & 2 DNA (HSV) 梅毒螺旋體基因測試 Treponema Pallidum DNA (TP) 陰道加德納菌基因測試 Gardnerella Vaginalis DNA (GV) 白色念珠菌基因測試 Candida Albicans DNA (CA)	\$1400				●

【檢查注意事項】

第1-6項 血液檢查 (檢查者不需要空腹)

第7-9項 尿液檢查 (女士亦可以子宮頸採檢方式進行有關檢查)
 • 建議取晨尿 (早上第一次的頭段小便) 或與上一次小便相隔超過兩小時的樣本 (頭段小便), 因為尿液中DNA細胞較多, 效果會較好。如有需要, 客戶可事前到中心領取尿液樣本樽在家中留樣本。
 • 檢查前三天不建議進行性行為。
 • 女士於經期前三天至完畢後七天期間進行檢查。

☎ 毅力綜合醫護體檢中心 Kinetics Integrated Medical & Health Centre

- 【📍 佐敦 Jordan】 九龍佐敦彌敦道363號恆成大廈14樓1409-12室 Tel : 3426 9771
 Room 1409-1412, 14/F, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Jordan, Kowloon
- 【📍 銅鑼灣 Causeway Bay】 香港銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心(舊翼)17樓1709室 Tel : 3520 3292
 Room 1709, 17/F, East Point Center (Old Wing), 555 Hennessy Road, Causeway Bay, H.K.
- 【📍 荃灣 Tsuen Wan】 新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號南豐中心19樓1912室 Tel : 3101 4866
 Room 1912, 19/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, N.T.

服務時間 Service Hours : ● 星期一至五 Mon-Fri : 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 Sat : 09:00 - 14:00
 ● 星期日及公眾假期 Sun & Public Holiday : 休息 Closed

☎ WhatsApp 查詢/預約 : 9336 8186 (辦公時間內回覆, 只接受文字訊息 Text Only)

一般查詢 General Enquiry : 2310 2997 / enquiry@kinetics.hk 客戶服務電郵 Customer Service E-mail : cs@kinetics.hk

網址 Website : www.kinetics.hk 網上商店 E-SHOP : www.kinetics-eshop.hk



E-SHOP

條款及細則: 1.有效期至2025年12月31日。2.如有任何更改,恕不另行通知,以最新版本為準。3.網上或WhatsApp預約只接受一星期以後之預約,所有預約必須待本中心職員回覆作實方為有效。未經確定的預約將不獲受理,不便之處,敬請諒解。4.如有任何爭議,毅力醫護健康集團保留解釋和終止服務之最終決定權。版權所有,不得轉載。

kinetics.medical kineticsmedical

Copyright 2025 Mar

性病檢查

Sexually Transmitted Diseases Screening




認真專注 關懷
Precise, Focus and Care

www.kinetics.hk
www.kinetics-eshop.hk



全球每天約有一百萬人患上性病，而當中絕大部份早期都沒有任何徵狀，因此不少患者都不知自己患病。性病的潛伏期有長有短，患者如未能及早治療，很容易將性病傳染給性伴侶。



傳播途徑

性病的傳播途徑主要分為直接接觸傳染和間接接觸傳染兩類。

- 直接接觸傳染也稱性接觸傳染，是主要的傳染方式，佔 95% 以上。
- 間接接觸傳染是通過接觸污染的衣服、浴池、共用浴具、馬桶等方式傳播，也包括一些少見的傳播方式，如通過輸血、輸血液製品、使用污染的醫療器械、及胎盤傳播、產道傳播等。

感染性病，男女有別

性病會影響性器官，可能造成痛楚、不育等，有些更會蔓延到身體其他器官，引起併發症，甚至造成死亡。感染了性病也可能影響下一代的健康，如梅毒、淋病、皰疹二型及愛滋病。

性病傳染男女有別，由於兩性間生殖、泌尿系統結構功能不同，所以男女性病存在一定的差異：

- 男性急性發病較多，女性慢性感染，帶菌者較多。
- 男性臨床徵狀較典型，易診斷。女性徵狀不明顯，容易誤診，漏診。
- 與性病者進行無保護的性接觸，女性被傳染的機會大於男性。
- 女性可通過胎盤、產道、母乳將性病傳染給下一代。
- 男性較易自行發現生殖器官的改變，女性則較為困難。

預防性病

最有效預防性病的方法，當然是採用安全性行為，當中性病與愛滋病毒大量存在於帶菌者的血液、精液及陰道分泌液中，所以上述三種體液都有高度傳染性，如接觸到傷口或黏膜（如陰道、尿道、口腔、肛門）便可以構成感染。故此應留意下列各點：

- 採用安全的性行為，與性對象保持專一的性關係。
- 性交時，應配戴安全套及確保正確使用。
- 性生活活躍人士，應接受定期檢查。如有懷疑，亦應立即接受檢查。

【常見的性接觸疾病】

1. 乙型肝炎 Hepatitis B

乙型肝炎主要是透過性接觸傳播。病毒能令大量肝細胞死亡，損害肝臟功能。部份受感染人士會終身成為帶菌者，日後更可能發展為慢性肝炎、肝硬化，甚至肝癌。

2. 愛滋病 HIV

愛滋病由HIV病毒所引起，又名後天免疫力缺乏症，病毒主要藏於血液、精液、陰道分泌物之中。破壞人體免疫系統，使患者無法抵禦疾病入侵。感染者會隨著免疫系統減弱而染上某些特殊的病症，如同機性感染。

3. 皰疹 2 型 Herpes Simplex (HSV)

皰疹是黏膜或皮膚傷口與患者生殖器上的皰疹接觸傳染得來的，最普遍的傳播行為是性交。患者的陰莖、尿道、陰唇或子宮頸等部位會感到痕癢，然後出現細小的水泡，不久，這些水泡會變成膿泡，破裂後成為小潰瘍，流出透明液體，令患者疼痛非常。而且患體內的病毒會永遠隱伏在神經系統內，間中復發。

4. 梅毒 Syphilis (VDRL / Treponema Pallidum)

梅毒主要透過與患者的性接觸，包括性交、口交、肛交等而傳染得來的。隱性期患者全無徵狀，只有驗血才會知道。晚期梅毒患者會在染上病毒數年到數十年後病發，病菌會影響心臟血管及中樞神經系統，導致失明、殘廢、精神病，甚至死亡。

5. 衣原體 Chlamydia (CT – Chlamydia Trachomatis)

受衣原體感染的男性患者，嚴重會引致睪丸炎、精囊炎、輸精管炎，嚴重者更會導致輸精管閉塞，女性患者會由子宮開始散播到輸卵管，輸卵管組織會受到衣原體破壞，做成輸卵管發炎及閉塞等現象，引致宮外孕或不育的問題。

6. 淋病 Gonorrhea (NG – Neisseria Gonorrhoeae)

淋病主要是透過與患者性交，感染到淋病雙球菌得來的。大約百分之五十至八十的女性患者並無病徵，因此不易察覺。淋病可引起前庭大腺炎、盆腔炎，或因輸卵管炎而導致不育等。若不及早治療，會令其他生殖器官如附睪、前列腺、尿道球腺等受感染，並使尿道收窄，小便困難，甚而引致腎衰竭。

7. 解脲脲原體 (UU - Ureaplasma Urealyticum)、微小脲原體 (UP - Ureaplasma Parvum)、人型支原體 (MH - Mycoplasma Hominis)、生殖支原體 (MG - Mycoplasma Genitalium)

感染初期通常無任何症狀，所以大多數人都沒有意識到他們已被感染。男性感染解脲脲原體，較輕微的症狀有尿道輕微刺痛、尿道發紅、小便起泡，亦有可能出現嚴重的症狀，如下腹部疼痛、排尿疼痛、排尿增加、尿流減弱，膀胱過度敏感等前列腺炎症狀。更甚者，有可能會出現勃起功能障礙、射精疼痛等和尿道出血。

而女性感染解脲脲原體，一般會出現陰道、宮頸發炎不適和分泌物增多，白帶有異常氣味。如未能及時醫治，有機會引起子宮內膜炎、輸卵管纖毛腫脹，影響日後生育。即使成功懷孕，胎兒也很容易夭折、死亡等。

8. 滴蟲 (TV - Trichomonas Vaginalis)

若染上滴蟲，並蔓延到宮腔，可以引起宮腔感染。在懷孕早期容易引起流產、胎兒畸形，中期容易造成胎膜早破、胎盤早剝，同時通過胎盤直接引發胎兒感染。